Paxlovid™
(PF-07321332 150 mg Tabletten | ritonavir 100 mg Tabletten)

Pfizer

NEU: Bevorratung und Abgabe von PAXLOVID™ durch Ärzt:innen

Seit dem **18. August 2022** können Ärzt:innen das antivirale Arzneimittel PAXLOVID™ – zusätzlich zur normalen Verschreibung und Abgabe über die Apotheke – auch direkt an ihre Patient:innen abgeben.

Informationen zur direkten Abgabe an Patient:innen

Bevorratung

Vertragsärzt:innen des hausärztlichen Versorgungsbereichs, privat tätige Hausarztpraxen und Krankenhausärzt:innen (ambulante Notfallbehandlung):
5 PAXLOVID™-Packungen. Ausgenommen sind Kinder- und Jugendärzt:innen.

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen:
< 150 Bewohner:innen 5 PAXLOVID™-Packungen
> 150 Bewohner:innen 10 PAXLOVID™-Packungen
(Abgabe nur nach ärztlicher Verschreibung)

Apotheken: unbegrenzt

Bestellung und Lieferung

Bestellung und Lieferung über die regelmäßige Bezugsapotheke via Muster-16-Rezept (Vertragsärzt:innen) bzw. blaues Rezept (Privatärzt:innen):

1. Ohne Namensnennung
2. Kostenträger: Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), IK 103609999
3. PZN für PAXLOVID™ nur zur Bevorratung: 18268938



Vergütung (netto)

Bei Abgabe durch Ärzt:innen:

- Apotheken: 15 € pro Packung für Abgabe + 6,72 € für die Lieferung an die Hausarztpraxis
- Hausärzt:innen: 15 € pro Packung für die direkte Abgabe

Bei (fernmündlicher) Verordnung durch Fachärzt:innen:

- Apotheken: 30 € für die Abgabe + 6,72 € bei Lieferung durch den Botendienst

Abrechnung und Dokumentation

Für Ärzt:innen:

- Abrechnung mit **Pseudoziffer 88125** über die Kassenärztliche Vereinigung
- Keine Nachweispflicht für Nachbestellungen

Für Apotheken:

- Bevorratungsrezept beim Rechenzentrum einreichen

Halten Sie PAXLOVID™ für Risikopatient:innen bereit

Hinweis zur PAXLOVID™- Abgabe an Patient:innen: Legen Sie die aktuelle Gebrauchsinformation bei.

Gebrauchsinformation
Zum Herunterladen auf der Seite des BfArM

Weiterhin gilt:

- Patientenindividuelle Verordnungen, die Patient:innen selbst in der Apotheke einlösen, sind weiterhin möglich (für fachärztlich tätige Vertragsärzt:innen sowie Kinder- und Jugendärzt:innen verpflichtend). Die Abrechnung erfolgt weiterhin über die bisherige BUND-PZN 17977087.
- Verschreibung nach Maßgabe der Empfehlungen der Fachgesellschaften, veröffentlicht über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM, www.bfarm.de/covid-19-arzneimittel)
- Gültigkeitsdauer der Verschreibung von fünf Werktagen
- Abgabe oder Verschreibung nach patientenindividueller Abwägung
- Therapieeinleitung bei entsprechender klinischer Symptomatik auf Grundlage eines positiven Schnelltests oder eines PCR-Tests

Für weitere Informationen besuchen Sie Pfizerpro.de/Paxlovid oder kontaktieren Sie Ihren Kontakt bei Pfizer Pharma GmbH.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

Paxlovid™ 150 mg + 100 mg Filmtabletten Wirkstoffe: PF-07321332 u. Ritonavir **Zusammensetzung:** Wirkstoffe: 1 pinkfarb. Filmtbl. enth. 150 mg PF-07321332, 1 weiße Filmtbl. enth. 100 mg Ritonavir. Sonst. Bestandteile: PF-07321332-Tbl-kern: mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Natriumstearylfumarat. PF-07321332-Tbl-film: Hypromellose (E 464), Titandioxid (E 171), Macrogol (E 1521), Eisen(III)-oxid (E 172). Ritonavir-Tbl-kern: Copovidon, Sorbitanlaurat, hochdisperses Siliciumdioxid, Calciumhydrogenphosphat, Natriumstearylfumarat. Ritonavir-Tbl-film: Hypromellose (E 464), Titandioxid (E 171), Macrogol (E 1521), Hyprolose (E 463), Talkum (E 553b), hochdisperses Siliciumdioxid (E 551), Polysorbat 80 (E 433). **Anwendungsgebiete:** Behandl. e. COVID-19 b. Erw., d. keine zusätzl. Sauerstoffzufuhr benötigen u. e. erhöhtes Risiko haben, e. schweren COVID-19-Verlauf zu entwickeln. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe od. sonst. Bestandteile. Arzneimittel m. stark CYP3A-abhängiger Clearance, b. denen e. erhöhte Plasmakonzentration m. schwerwiegenden u./ od. lebensbedrohl. Reaktionen einhergeht. Arzneimittel, d. starke CYP3A-Induktoren sind, b. denen signifikant reduzierte PF-07321332/ Ritonavir-Konzentrationen i. Plasma m. e. potenziellen Verlust des virolog. Ansprechens u. e. mögl. Resistenzbild. einhergehen können. Die Behandlung m. Paxlovid darf nicht unmittelbar nach dem Absetzen e. d. folgenden Arzneimittel begonnen werden, da d. Wirk. des kürzl. abgesetzten CYP3A-Induktors verzögert nachlässt. Die hier aufgeführten Arzneimittel stellen e. Orientierungshilfe dar. Es handelt sich nicht um e. vollständige Liste aller Arzneimittel, d. m. Paxlovid kontraindiziert sind: α1-Adrenorezeptor-Antagonist: Alfuzosin; Analgetika: Pethidin, Propoxyphen; Antianginöse Arzneimittel: Ranolazin; Arzneimittel gg. Krebserkrank.: Neratinib, Venetoclax; Antiarrhythmika: Amiodaron, Bepridil, Dronedaron, Encainid, Flecainid, Propafenon, Chinidin; Antibiotika: Fusidinsäure, Rifampicin; Antikonvulsiva: Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin; Arzneimittel gg. Gicht: Colchicin; Antihistaminika: Astemizol, Terfenadin; Antipsychotika/ Neuroleptika: Lurasidon, Pimozid, Clozapin, Quetiapin; Ergotaminderivate: Dihydroergotamin, Ergometrin, Ergotamin, Methylergometrin; GI-motilitätsmodifizierende Arzneimittel: Cisaprid; Pflanzliche Arzneimittel: Johanniskraut (Hypericum perforatum); Lipidsenker: HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren: Lovastatin, Simvastatin, Inhibitoren des Mikrosomalen Triglycerid-Transferproteins (MTTP): Lomitapid; PDE-5-Inhibitoren: Avanafil, Sildenafil, Vardenafil; Sedativa/ Hypnotika: Clorazepat, Diazepam, Estazolam, Flurazepam, oral angewendetes Midazolam u. Triazolam. **Nebenwirkungen:** *Häufig:* Geschmacksstör., Kopfschmerzen, Diarrhö, Erbrechen. **Warnhinweise:** Enth. Lactose. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. **Abgabestatus:** Verschreibungspflichtig. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgien. **Repräsentant in Deutschland:** PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. **Stand:** Juli 2022. b-2v2pax-ft-0

Pfizer

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/00000-0000-0000

Paxlovid™
(PF-07321332 150 mg Tabletten | ritonavir 100 mg Tabletten)